

NemasysTM L

Biologisch product tegen de taxuskever

Inhoud: 250 miljoen insektparasitaire aaltjes (*Steinernema krausse*)

Bewaren in de koelkast (5 °C)
Niet invriezen
Niet in direct zonlicht laten liggen
Gebruiken voor de uiterste gebruiksdatum
Lees de ingesloten gebruiksaanwijzing voor gebruik

Geproduceerd door:
Becker Underwood
Littlehampton, UK



NemasysTM is een geregistreerd handelsmerk van Becker Underwood.

Nemasys® L

Biologisch bestrijdingsmiddel tegen taxuskever

Inhoud:

insekt parasitaire aaltjes, *Steinernema kraussei* 33%
vermiculiet en water 67%

Elke verpakking bevat minimaal 250 miljoen actieve aaltjes.
Eén verpakking is voldoende voor bestrijding op 500 m²
containerteelt, of 250 m² vollegrondteelt.

Nemasys® L is een biologisch bestrijdingsmiddel tegen larven van de taxuskever (*Otiorhynchus sulcatus*). Het bevat insekt parasitaire aaltjes die de larven van de taxuskever opsporen en doden. De aaltjes kunnen ook van nature in de grond voorkomen. Ze zijn zeer specifiek en ongevaarlijk voor het gewas, de mens, het milieu en nuttige insecten.

Dosering

Containerteelt: één verpakking per 500 m².
Vollegrond: één verpakking per 250 m².

	Vollegrond	Containers	
Aangieten	1 verpakking op 1000 l	1 verpakking op 2000 l	4 l / m ²
Spuiten	1 verpakking op 250 l	1 verpakking op 500 l	1 l / m ²

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder alle fijne filters (kleiner dan 1 mm), ook bij de spuitdoppen.
- Gebruik een spuitdop met een opening van minimaal 1 mm.
- Los de inhoud van een verpakking op in een emmer met water en roer de oplossing goed door.
- De oplossing in de spuittank gieten. Vul de emmers nogmaals en herhaal de procedure.
- Tijdens het spuiten de oplossing continu in beweging houden.
- Doseer Nemasys® L volgens de aangegeven dosering.
- Na toepassing nogmaals inregen en de grond enige dagen vochtig houden.

Tijdstip van toepassing

Containerteelt binnen

- Aangezien kevers en larven hier continu aanwezig kunnen zijn, kan de toepassing jaarrond worden uitgevoerd.

Containerteelt buiten en vollegrond

- Het beste tijdstip van toepassing is van maart tot mei en van augustus tot november, bij een bodemtemperatuur van 5 °C of meer voor een periode van minimaal twee weken na toepassing. Zorg ervoor dat er eind augustus geen volwassen kevers meer in het veld zijn.

Aanbevelingen voor optimaal resultaat

- De bodemtemperatuur moet tussen de 5 en de 30 °C zijn. Bij te lage temperatuur kunnen containers enige dagen binnen gezet worden om de bodemtemperatuur te laten oplopen.
- De bodem moet vochtig zijn, niet toepassen bij zonnig weer.
- De verpakking in één keer gebruiken.
- De spuitoplossing kan niet bewaard worden.
- Bij verspuiten over het gewas, het gewas naspoelen met water zodat alle aaltjes in de bodem terecht komen.
- Nemasys® L kan gecombineerd worden met de meeste chemische middelen, sommige middelen kunnen problemen geven. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.
- De aaltjes zijn vier weken werkzaam.

Bewaren

- Koel en donker bewaren (5 °C), maar niet invriezen.
- Gebruik de inhoud in één keer.
- Gebruiken voor het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum.

Geproduceerd door:



Distributeur:



Becker Underwood garandeert dat het product voldoet aan de specificaties op de verpakking. Daar toepassing plaatsvindt buiten onze controle, is de leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen