

ziekte / plaag	(1) chemische naam	* let op herbestrijdingsdij	Bedekte Onbedekte	werkzame stof	(3) werkwijze	(4) hoeveelheid spuitvoersstof	dosering		formulering	Aanbevolen huistref	(7) Max. aantal behandelingen/teelt/jr	Maximale hoeveelheid / ha	Min. interval tussen de toepassingen in den	Min. interval tussen de toepassingen in den	opmerkingen
							spuiten per 100 liter	foggen of LVM per 1000 m ²							
insecticiden en acariciden															
Bladvluis															
	1	Admident	X X	pirimicarb 50 %	c/m/d		50 g		WG	2 / jr	0,5 kg	7	-	-	Geen werking tegen katzenluis. (5). Zie voor restricties toepassing / spuitapparatuur in onbedekte teelten het etiket.
		Admident rookontwikkelaar	X X	pirimicarb 10 %	c/m/d	n.v.t.	1 rookontwikkelaar / 400 m ²		RO	2 / jr	25 st.	10	-	-	De behandelde ruimtes moet 3 tot 6 uur na het roken gesloten blijven. Behandelde ruimten gedurende deze tijd niet betreden. Niet toepassing met brandende CO ₂ apparatuur. Geen werking tegen katzenluis.
	3a	Raptol	X X	pyrethrine 4,59 g/l koolzaadolie 825,3 g/l	c		1 l		EC	4 / jr	12 l	14	-	-	Toepassen in maximaal 600 l water per ha voor planten < 50 cm, maximaal 900 l water per ha voor planten > 50 cm en < 125 cm, maximaal 1200 l water per ha voor planten > 125 cm. Ook effectief tegen wol-, dop en schuldus met uitzondering van m.w.p. utruswollus (Pseudococcus citri) maar wel tegen utruswollus (Planococcus citri).
	4a	Gazelle	X X	acetamiprid 20 %	c/l/s		25 g		WG	3 / jr	230 g	30	-	-	Menging van een middel uit chem. grp 3 is toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.
	4d	Sivanto Prime (niet grondgebonden teelt)	X X	flupyradifuron 200 g/l	ls		50 ml		WG	4 / jr	0,5 l	7	-	-	Mag gedurende de bloei worden toegepast, mits niet wordt gemengd met een fungicide uit de chem. groep 3.
	9c	Teppilo	X X	flonicamid 50%	ls		0,14 kg/ha		WG	3 teelt	0,14 kg	21	-	-	
		Batavia SC (niet grondgebonden)	X X	spirotretamat 100 g/l	s		75 ml		SC	6 / jr	0,75 l	14	-	-	Niet toepassen in Salix (Salicaceae). Pas het toe als het gewas krachtig groeit, en dus niet op een verouderend of in stress verkerend gewas en er voldoende blad aanwezig is.
	23	Batavia SC (grondgebonden)	X X	spirotretamat 100 g/l	s		75 ml		SC	2 / jr	0,75 l	14	-	-	Niet toepassen in Salix (Salicaceae). Pas het toe als het gewas krachtig groeit, en dus niet op een verouderend of in stress verkerend gewas en er voldoende blad aanwezig is.
		Batavia SC (na de bloei)	X X	spirotretamat 100 g/l	s		75 ml		SC	2 / jr	0,9 l	14	-	-	Niet toepassen in Salix (Salicaceae). Pas het toe als het gewas krachtig groeit, en dus niet op een verouderend of in stress verkerend gewas en er voldoende blad aanwezig is. Toepassen na de bloei.
		Movento	X X	spirotretamat 150 g/l	s		50 ml		OD	2 / jr	0,6 l/ha	14	-	-	
	UN	NeemAzal	X X	azadirachtin 10 g/l	m		3,75 l/ha		EC	6*3 18 / jr	3,75 l	7	1,5 mnd	-	Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen.
			X X				3 l/ha		EC	3*2 6 / jr	3 l	7	2,5 mnd	-	Toepassen in 3 blokken van 2 opeenvolgende besputingen.
Emelten															
		Nemays F	X X	Steinernema feltiae		n.v.t.	aangieten	gel	Aq	-	-	-	-	-	Aaltjespreparaat. Nemays F toepassen op jonge emelten. Houdt de vluchten van langpootmuggen in de gaten en pas het na een vlucht toe. De meest voorkomende langpootmug vliegt van augustus tot oktober. Raadpleeg het etiket of uw Brinkman-adviseur voor de juiste dosering.
Mineervlieg															
	3a	Decis	X X	deltamethrin 25 g/l	c/m		20 ml		EC	3 / jr	0,15 l	7	-	-	Maximaal 0,15 l/ha/keer. Minimale interval tussen de toepassingen 7 dagen. M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
			X X				20 ml		EC	3 / jr	0,24 l	7	-	-	Zie voor restricties toepassing / spuitapparatuur in onbedekte teelten het etiket. M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
	6	Vectine Plus	X X	abamectin 18 g/l	ls		50 ml		EC	8 / jr	0,5 l	7	-	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
		Vertimec Gold	X X	abamectin 18 g/l	ls		50 ml		EC	8 / jr	0,5 l	7	-	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
	28	Mainspring	X X	cytranilprole 400 g/kg	m/l/s		10 g		WG	Ha	2*2 4 / jr	0,12 kg	7	60	Voeg Hasten Spray Adjutant toe voor een betere opname van het middel in het blad.
	UN	NeemAzal	X X	azadirachtin 10 g/l	c		3,75 l/ha		EC	6*3 18 / jr	3,75 l	7	1,5 mnd	-	Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen.
			X X				3 l/ha		EC	3*2 6 / jr	3 l	7	2,5 mnd	-	Toepassen in 3 blokken van 2 opeenvolgende besputingen.
Rups en bladrollers															
	3a	Decis	X X	deltamethrin 25 g/l	c/m		20 ml		EC	3 / jr	0,15 l	7	-	-	Bij rupsen van de bastaardsatijnvlinder toepassen in de nazomer vóórdat de rupsen zich inspinen. M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen
			X X				20 ml		EC	3 / jr	0,24 l	7	-	-	Zie voor restricties toepassing / spuitapparatuur in onbedekte teelten het etiket. Bij rupsen van de bastaardsatijnvlinder toepassen in de nazomer vóórdat de rupsen zich inspinen. M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen
	5	Tracer	X X	spinosad 480 g/l	c/m		20 ml		SC	Ha	3 / jr	0,2 l	7	-	Let op alleen toegelaten in klimplanten en sierheesters onbedekt.
		Dipel	X X	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 54%	m		100 - 200 g / 100 l		WG	8 / jr	1 kg	7	-	-	
	11a	Turex WG	X X	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 25000 iu/mg	m		50-100 g		WG	6 / jr	1 kg	7	-	-	
		XenTari WG	X X	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 15000 iu/mg	m		100 g		WG	8 / jr	1 kg	5	-	-	
			X X				1 kg / ha		WG	8 / jr	1 kg	6	-	-	
	22b	Verismo (niet grondgebonden teelt)	X X	metaflumizone 240 g/l	c/m		100 ml		SC	2/teelt	1 l	7	-	-	
		Verismo (grondgebonden teelt)	X X						SC	2 / jr	1 l	7	-	-	
	28	Mainspring	X X	cytranilprole 400 g/kg	m/l/s		10 g		WG	Ha	2*2 4 / jr	0,12 kg	7	60	Voeg een uitvoerder als H-wett toe voor een betere verdeling van het middel op en onder het blad.
	UN	NeemAzal	X X	azadirachtin 10 g/l	c		3,75 l/ha		EC	6*3 18 / jr	3,75 l	7	1,5 mnd	-	Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen.
			X X				3 l/ha		EC	3*2 6 / jr	3 l	7	2,5 mnd	-	Toepassen in 3 blokken van 2 opeenvolgende besputingen.
Spint															
	B	Requiem Prime	X X	Terfenol blend QRD 460 152,3 g/l	c		650 ml		EC	12 / jr	7,8 l	7	-	-	Indien geen ervaring eerst proefbesputing uitvoeren.
		Milbeknock	X X	milbectin 1%	c/m/l/s		50 ml		EC	2 / jr	0,5 l	7	-	-	Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel door middel van een gewasbesputing te worden toegepast. Zie voor restricties toepassing / spuitapparatuur het etiket.
		Vectine Plus	X X	abamectin 18 g/l	c/m/l/s		50 ml		EC	8 / jr	0,5 l	7	-	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
		Vertimec Gold	X X	abamectin 18 g/l	c/m/l/s		50 ml		EC	8 / jr	0,5 l	7	-	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
		Apollo (niet grondgebonden)	X X	chlorfentozin 500 g/l	c		30 ml		SC	1 / jr	0,3 l	-	-	-	Bonenspirite (Tetranychus urticae). Een behandeling uitvoeren wanneer de eieren worden waargenomen. Fruitspint (Panonychus ulmi), in het voorjaar het middel toepassen ruim voor het uitkomen van de eerste winterlingen: in de zomer toepassen op het moment van etlop of spoedig daarna.
	10a	Apollo	X X				30 ml		SC	1 / jr	0,3 l	-	-	-	
		Nissorun vib	X X	hexythiazox 250 g/l	c		20 ml		SC	2*4 9 / jr	0,2 l	7	-	-	Tussen de 2 blokken minimaal een toepassing met 'n' middel uit een andere chemische groep.
			X X				20 ml		SC	3 / jr	0,24 l	7	-	-	
		Borneo (meerdere teeltcycli / jr)	X X	etoxazole 110 g/l	c		50 ml		SC	2*2 4 / jr	0,5 l	7	2 mnd	-	Een minimum interval van 2 maanden tussen de blokken aanhouden.
	10 b	Borneo (meerdere teelt)	X X				50 ml		SC	2 / jr	0,5 l	7	-	-	
	20b	Cantack	X X	acetoquinolyl 164 g/l	c		100 ml		SC	3*3 9 / jr	1,2 l	7	28	-	Maximaal 3 blokken per jaar. Tussen de blokken dient er wel een middel met een ander werkmakere stof toegepast te worden. Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel d.m.v. een gewasbesputing te worden toegepast.
	20d	Floramate 240 SC	X X	bifenazate 240 g/l	c		40 ml		SC	2*2 4 / jr	0,6 l	7	56	-	Maximaal 2 toepassingen per blok. Toevoegingsvoorzinnen alleen op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.
	21a	Carex 10SC	X X	pyridifen 100 g/l	c		140 ml		SC	1 / jr	1,4 l	-	-	-	
	25a	Scalta	X X	cyflumetofen 200 g/l	c/m		100 ml		SC	2*2 4 / jr	1 l	7	-	-	Tussen de 2 blokken dienen tenminste twee toepassingen te worden uitgevoerd met middelen uit een andere chemische groep. Niet toegestaan in de onbedekte teelt in de periode van 1 september tot 1 maart. Niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.
			X X						SC	2 / jr	1,2 l	7	-	-	Tussen de 2 blokken dienen tenminste twee toepassingen te worden uitgevoerd met middelen uit een andere chemische groep. Niet toegestaan in de onbedekte teelt in de periode van 1 september tot 1 maart. Niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.
Taxuskever															
	B	Nemays H	X X	Heterorhabditis megidis		n.v.t.	aangieten	gel	Aq	-	-	-	-	-	Aaltjespreparaat. Ook geschikt voor lagere temperaturen. (Pot)grond aangieten. Raadpleeg het etiket of uw Brinkman-adviseur voor de juiste dosering.
		Nemays L	X X	Steinernema kraussei		n.v.t.	aangieten	gel	Aq	-	-	-	-	-	
	22b	Verismo (niet grondgebonden teelt)	X X	metaflumizone 240 g/l	c/m		100 ml		SC	2/teelt	1 l	7	-	-	
		Verismo (grondgebonden teelt)	X X						SC	2 / jr	1 l	7	-	-	
Trips															
	B	Requiem Prime	X X	Terfenol blend QRD 460 152,3 g/l	c		650 ml		EC	12 / jr	7,8 l	7	-	-	Requiem Prime heeft vooraf meerwaarde in de mix met o.a. Botanigard WP en Vectine/Vertimec. Indien geen ervaring eerst proefbesputing uitvoeren.
		Azatin	X X	azadirachtin 26 g/l	c		140 ml		EC	Su	5*4 20 / jr	1,4 l	7	42	Toepassen in 5 blokken van 4 toepassingen per jaar.
	UN	NeemAzal	X X	azadirachtin 10 g/l	c		3,75 l/ha		EC	Su	6*3 18 / jr	3,75 l	7	1,5 mnd	Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen.
			X X						EC	Su	3*2 6 / jr	3 l	7	2,5 mnd	Toepassen in 3 blokken van 2 opeenvolgende besputingen.
	H	Sugarbat	X X	hommelvoeding	c		150-200 ml		vst.	-	-	-	-	-	Lokmiddel voor zuigende insecten. Aan een tripsbestrijdingsmiddel toevoegen.
	5	Tracer	X X	spinosad 480 g/l	c/m		20 ml		SC	Ha	3 / jr	0,2 l	7	-	Let op alleen toegelaten in klimplanten en sierheesters onbedekt.
	UNF	BotaniGard WP	X X	Bauveria bassiana strain GHA 4,4x10 ¹⁰ CFU/G	c		62,5 g		WP	Su	10 / jr	0,6 kg	5	-	
	1a	Winner	X X	fometenaat 50%	c/m		30 g	30 g (LVM)	WP	Su	4 / jr	0,3 kg	7	-	
			X X				20 ml		WP	Su	3 / jr	0,15 l	7	-	
	3a	Decis	X X	deltamethrin 25 g/l	c/m		20 ml		EC	Su	3 / jr	0,24 l	7	-	Zie voor restricties toepassing / spuitapparatuur in onbedekte teelten het etiket. M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
		Raptol	X X	pyrethrine 4,59 g/l koolzaadolie 825,3 g/l	c		1 l		EC	Su	4 / jr	12 l	14	-	Toepassen in maximaal 600 l water per ha voor planten < 50 cm, maximaal 900 l water per ha voor planten > 50 cm en < 125 cm, maximaal 1200 l water per ha voor planten > 125 cm.
	6	Vectine Plus	X X	abamectin 18 g/l	ls		50 ml		EC	Su	8 / jr	0,5 l	7	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
		Vertimec Gold	X X	abamectin 18 g/l	ls		50 ml		EC	Su	8 / jr	0,5 l	7	-	M.i.v. 6-10-2022 verbod stapelen middelen met dezelfde werkmakere stof.
	28	Mainspring	X X	cytranilprole 400 g/kg	m/l/s		10 g		WG	Ha	2*2 4 / jr	0,12 kg	7	60	Voeg een uitvoerder als H-wett toe voor een betere verdeling van het middel op en onder het blad.
Wittevlieg															
	B	BotaniGard WP	X X	Bauveria bassiana strain GHA 4,4x10 ¹⁰ CFU/G	c		62,5 g		WP	Su	10 / jr	0,6 kg	5	-	
		Requiem Prime	X X	Terfenol blend QRD 460 152,3 g/l	c		650 ml		EC	12 / jr	7,8 l	7	-	-	Requiem Prime heeft vooraf meerwaarde in de mix met o.a. Botanigard WP, Calypso, Gazelle en Sivanto Prime. Indien geen ervaring eerst proefbesputing uitvoeren.
	UN	NeemAzal	X X	azadirachtin 10 g/l	c		3,75 l/ha		EC	6*3 18 / jr	3,75 l	7	1,5 mnd	-	Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen.
			X X						EC	3*2 6 / jr	3 l	7	2,5 mnd	-	Toepassen in 3 blokken van 2 opeenvolgende besputingen.
	3a	Raptol	X X	pyrethrine 4,59 g/l koolzaadolie 825,3 g/l	c		1 l		EC	4 / jr	12 l	14	-	-	Toepassen in maximaal 600 l water per ha voor planten < 50 cm, maximaal 900 l water per ha voor planten > 50 cm en < 125 cm, maximaal 1200 l water per ha voor planten > 125 cm.
	4a	Gazelle	X X	acetamiprid 20 %	c/l/s		25 - 50 g		WG	6 / jr	462 g	7	-	-	
	4d	Sivanto Prime (niet grondgebonden teelt)	X X	flupyradifuron 200 g/l	ls		75 ml		WG	4 / jr	0,75 l	7	-	-	
	7	Admiral	X X	pyriproxyfen 100 g/l	c		25 ml		EC	2 / jr	0,25 l	7	-	-	Werkzaam op het ei tot poststadium, niet tegen volwassenen.
		Proxval	X X	pyriproxyfen 100 g/l	c		25 ml		EC	2 / jr	0,25 l	7	-	-	Werkzaam op het ei tot poststadium, niet tegen volwassenen.
nematoden															
Aaltjes															
	1a	Ydiate 10 G	X X	oxamyl 10%	s	n.v.t.	40 kg/hectare	gran.		1 / jr	40 kg	-	-	-	Volledig

Spuitadvieskaart boomkwekerij

Main table with columns for disease/plaag, chemical name, active ingredient, application method, dosage, and remarks. Includes sections for Botrytis, Echte meeldauw, Phytophthora & Pythium, Rhizoctonia, Roest, Sclerotinia, Taksterfte, Valse meeldauw, herbiciden, mossen, reinigen, algem, organische vervuiling, ontsmetten, schimmels en virussen, and hulpstoffen.

Wij zijn een optiek van deze spuitadvieskaart. Vraag dan uw adviseur of bel met Royal Brinkman (0724-444100). Voor de meest recente versiedatum kijk op onze website www.brinkman.nl